

	Název	Vzhled-forma	Psych. závislost	Způsob použití	Možné účinky	Projevy předávkování	Abstinenci ní příznaky
Canabis	MARIHUANA	sušené listy,květové palice	nízká	kouřením, ústně	euforie, uvolnění zábran, zvýraznění chuti k jídlu, zmatené chování, zesílení momentálního duševního stavu, „flashback“	únava, paranoia, možná psychóza, krátkodobé selhání paměti,nevolnost	Může být i nepříliš výrazná nespavost, zvýšená aktivita, občas ztráta chuti k jídlu, nervozita
	HAŠIŠ	světle až tmavě hnědá plast.hmota	nízká				
	HAŠIŠOVÝ OLEJ	olej	nízká				
Stimulační	PERVITIN	hnědý až bílý prášek,roztok	vysoká	ústně,šňupáním,injekčně	Pokles soustředěnosti, excitace, euporie, pokles tepové frekvence a krevního tlaku, ztráta chuti k jídlu, celková stimulace, pocit zvýšené fyzické a psychické výkonnosti, schopnost vcítit se do druhého, nespavost	pokles tělesné teploty,křeče,halucinatorně-paranoidní psychóza možné úmrtí	Apatie, dlouhý spánek, podrážděnost, deprese, nervozita, neklid
	KOKAIN	bílý prášek,různobarevné tablety	vysoká	šňupáním, injekčně, kouřením			
	CRACK	bílé krastalky-bílá hmota	vysoká	kouřením			
	MDMA	barevné tablety s ražbou	možná	ústně			
	FENMETRAZIN	prášky	vysoká	ústně			
Opiáty	HEROIN	prášek od bílé po hnědu	vysoká	šňupáním, injekčně, kouřením,inhalacemi	euforie, zklidnění, nevolnost, útlum dýchání, zúžené zornice, tělesný útlum, znecitlivění, pocit lhostejnosti vůči problémům	Pomalé, povrchní dýchání, lepkavá kůže, křeče, kóma, zástava dechu a krevního oběhu Možné úmrtí	Vodnaté oči, zívání, ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, třes, panika, nevolnost, zimnice, pocení, bolest svalů a kloubů, průjem
	MORFIN	ampule	vysoká	injekčně,kouřením			
	CODEIN	tableta,roztok	střední	ústně,injekčně			
	BRAUN	hnědá tekutina	vysoká	injekčně			
	OPIUM	hnědá hmota	vysoká	ústně,kouřením			
	METADON	prášek,roztok	vysoká	injekčně,ústně			
Halucinogeny	LSD	prášek,různobarevné tablety,impregnované čtverečky papíru	střední	ústně	přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru, „flashback“	Psychózy, sebevraždy Možné úmrtí	Působení nevypočitatelné
	PSYLOCIBIN	sušené hlavičky, vývar, výluh	střední				
	MESKALIN	sušené hlavičky, vývar, výluh,prášek	střední				

Těkavé látky	TOLUEN ACETON NITROŘEDIDLO	čirá tekutina s výrazným zápachem	střední až vysoká	inhalacemi, ve spreji	otupení, polospánek, psychický útlum, poruchy vnímání	Poškození: jater, dýchacích cest, mozkových tkání Možné úmrtí	Předrážděnost, deprese, nespavost
Tlumící látky	DIAZEPAM ROHYPNOL RADEPUR FENOBARBITAL SEKONAL MEPROBAMAT	tablety	střední až vysoká	ústně, často s alkoholem	celkový útlum, setřená řeč, dezorientace, opilecké chování	Povrchní dýchání, lepkavá kůže, rozšířené zornice, slabý a rychlý pulz, kóma Možné úmrtí	Úzkost, nespavost, třes, delirium, křeče, epileptické záchvaty