

# Surdopedie

- Surdus – (z latiny - hluchý) + paidea (z řečtiny, výchova);
- *speciálněpedagogická disciplína zabývající se výchovou, vzděláním a rozvojem osob se sluchovým postižením; na světě 500 mil. osob s poruchou sluchu; v ČR asi 500 tisíc*
- od roku 1983 se vyčlenila z logopedie;
- *multidisciplinární obor* - speciální pedagogika, obecná pedagogika, obory medicínské;
- hlavní *cíl* surdopedie → zprostředkování komunikačních kompetencí;

# Kasifikace

- ***I. Místo vzniku postižení:***
- **periferní nedoslýchavost či hluchota**
- **převodní** (conductiva, konduktivní porucha) sluchové buňky jsou v pořádku, ale nejsou stimulovány zvukem, k jehož přerušení dojde vedením zvuku skrz zevní zvukovod a střední ucho.
- **percepční** (perceptiva, senzorienurální porucha) dochází k poruše vnitřního ucha, sluch. buněk, sl. nervů.
- 
- **smíšená** (mixta) – kombinace převodních a percepčních vad
- 
- **centrální nedoslýchavost či hluchota**
- zahrnuje komplikované defekty korových a podkorových systémů, sluchových vad; jde o abnormální zpracování zvukového signálu v mozku

- **II. Období vzniku postižení:**
- 
- **Hledisko věku:**
- ***fyziologická nemluvnost trvá do konce 1. roku života. Pokud to trvá do 3 let a dítě je jinak v pořádku, mluvíme o prodloužené fyziologické nemluvnosti.***
- 
- ***Vývojová nemluvnost (patologická) skutečně narušený vývoj řeči. Je třeba ji odlišit od získané nemluvnosti – neurotický či organický podklad.***
- 
- 
- **vrozené vady sluchu**
- geneticky podmíněné
- kongenitálně získané sluchové vady:
  - a) **prenatální** v průběhu těhotenství – 1. trimestr), toxoplazmóza, vliv RTG, nízká porodní váha
  - b) **perinatální** (období porodu – asfyxie, protražovaný porod, aj.
- 
- **Nejčastější vrozená porucha u novorozenců je právě porucha sluchu; (1 - 3 na 1000 novorozenců), 20x častější než např. fenylketonurie.**

- **získané vady sluchu**
- získané před fixací řeči – prelingválně, do 6. roku života
- získané po fixaci řeči – postlingválně, po 6. roce života a v průběhu života
- ***presbyakuzie*** (stařecká nedoslýchavost)
- *poranění hlavy a vnitřního ucha*
- dlouhodobé působení *silné hlukové zátěže*
- *toxiny, jedy*
- ***S věkem stoupají poruchy sluchu. Také častý tinnitus – jde o příznak onemocnění, ušní šelesty zapříčiněné špatným cévním zásobováním.***