

MATEMATIKA V EKONOMII – seminář č. 8 – Substitute v neurčitém integrálu, určitý integrál

SUBSTITUTE

Používáme následující substitute (přehled je značně zjednodušený!). Pokud integrál obsahuje:

i)  $\sqrt[n]{x} \Rightarrow x = t^n$

ii)  $e^x \Rightarrow e^x = t$

iii)  $a^x \Rightarrow a^x = t$

iv) závorku jako vnitřní funkci  $\Rightarrow$  závorka =  $t$

v)  $\cos^n x$  a  $\sin^n x$ : pokud jsou oba exponenty sudé, použijeme  $t = \operatorname{tg} x$ . Pokud je jedno z čísel  $m, n$  liché a druhé sudé  $\Rightarrow$  nahrazujeme pomocí  $t$  tu funkci, která má sudý exponent. Pokud jsou oba exponenty liché, nahradíme  $t$  funkci s vyšší mocninou. Při úpravách integrálu využíváme goniometrické vzorce. Obecně pak vždy funguje univerzální goniometrická

substitute  $\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t$

vi)  $\frac{\ln^k x}{x} \Rightarrow t = \ln x$

.....  
1. Vypočtete:

a)  $\int (2x+1)^4 dx$

b)  $\int \sqrt{5x-2} dx$

c)  $\int 4x\sqrt{x^2+1} dx$

d)  $\int \frac{2}{(3x+4)^3} dx$

e)  $\int \frac{\ln^2 x}{x} dx$

f)  $\int \cos x \sin^3 x dx$

g)  $\int \sqrt{1-x^2} dx$

h)  $\int e^{4x+5} dx$

i)  $\int \frac{e^x}{e^x+1} dx$

**Výsledky:** a)  $\frac{(2x+1)^5}{10} + C$ , b)  $\frac{2(5x-2)^{3/2}}{15} + C$ , c)  $\frac{4(\sqrt{x^2+1})^3}{3} + C$ , d)  $-\frac{1}{3(3x+4)^2} + C$ ,

e)  $\frac{\ln^3 x}{3} + C$ , f)  $\frac{\sin^4 x}{4} + C$ , g)  $\frac{\arcsin x}{2} + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2} + C$ , h)  $\frac{e^{4x+5}}{4} + C$ , i)  $\ln|e^x+1| + C$ .

URČITÝ INTEGRÁL

Newtonův-Leibnizův vzorec:  $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

1. Vypočtete:

a)  $\int_1^2 x^2 dx$

b)  $\int_1^4 (2x^2 + x - 1) dx$

c)  $\int_{-3}^3 (x^3 - x) dx$

d)  $\int_1^e \frac{2}{x} dx$

e)  $\int_0^\pi \sin x dx$

f)  $\int_2^7 \sqrt{x+2} dx$

$$\text{g) } \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos^2 x} dx$$

$$\text{h) } \int_1^5 |2-x| dx$$

**Výsledky:**

a)  $7/3$ , b)  $93/2$ , c)  $0$ , d)  $2$ , e)  $2$ , f)  $38/3$ , g)  $1$ , h)  $5$ .